



Bitki
Koruma

Fungisit
Mantar ilacı



**Şeker pancarında
güçlü hamle, etkin koruma.**

Sidnay SE

100 g/l Azoxystrobin + 80 g/l Tetraconazole



Sidnay SE



Suspo-Emülsiyon (SE)

100 g/l Azoxystrobin + 80 g/l Tetraconazole

SECTOR

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Şeker Pancarı	Yaprak leke hastalığı (<i>Cercospora beticola</i>)	125 ml/da	42 Gün

ŞEKER PANCARI - YAPRAK LEKE HASTALIĞI

Uygulamalara hastalık belirtisi görülür görülmez başlanmalıdır. Hasatla son ilaçlama arasındaki süre dikkate alınarak, hastalığın seyrine göre uygulamalara devam edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

SİDNAY SE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup C3,11** ve **G1,3** olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek **SİDNAY SE**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3,11 ve G1,3 harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılmalıdır.

