

Üretim ve son kullanma Tarihi:
Serj No:
Azamı perakende satış fiyatı:
Ruhsat Tarih ve numarası: 12.05.2016 /10634

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

| Bitki Adı | Zararlı organizma adı | Uygulama Dozu | Son uygulama ile hasat arasındaki süre |
|---------------|--|-----------------|--|
| Antep Fıstığı | Kara zenk (<i>Pseudocercospora pistachia</i>) | 100 ml/ 100 Lsu | 14 gün |
| Şeftali | Yaprak kıvrıklığı (<i>Taphrina deformans</i>) Karaleke(<i>Venturia inaequalis</i>) | 175 ml /100 Lsu | 14 gün |
| Elma | Sert çekirdekli meyvelerde çiçek Monilyası (<i>Sclerotinia laxa</i>) | 80 ml / 100 Lsu | 14 gün |
| Kayısı | Monilya(<i>Sclerotinia linhartiana</i>) | 80 ml / 100 Lsu | 14 gün |
| Ayva | | 100 ml /100 Lsu | 14 gün |

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünün önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdaki karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız

KALIBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilcek karışım miktarı iyi sağlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamamın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşatmayınız.

09 Aralık 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Genel Müdür Yardımcısı

SECTOR

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

ACS PROCOL SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu U:12 FUNGISİT (Mantar İlacı)

500 g/L Dödüne

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz
- **Bitki Koruma ürününün uygulaması sırasında hiçbir şey yemeyiniz.**
- İçmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulamış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, baş dönmesi ve kusma.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Hastanın ilacı temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. Hastayı ilağı sahadan uzaklaştırınız. Gözde değmişse, en az 15 dakika bol su ile yıkayınız. Doktor çağırınız. İlaç ambalajı ve etiketini birlikte götürünüz.

Genel Tedbirler: Maddenin buluştuğu bütün giysiler derhal çıkarılmalıdır. Zehirlenme belirtileri geç ortaya çıkabileceğinden kazazedeyle en az 48 saat gözleml altında bulundurun.

Göz: Gözlerinizi bol su ile en az 15 dak. yıkayın. Lens varsa çıkartın. Hemen doktora başvurun.

Cilt: KONTAMİNE OLMUŞ BÜTÜN KİYAFETLERİ ÇIKARTIN. Etkilenen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile iyice yıkayın. Eğer tahriş belirtileri varsa ürün etiketi ile doktora başvurun.

Soluma: Hastayı temiz havaya çıkartın. Soluma güçlüğü varsa oksijen verin. Hemen doktora başvurun.

Yutma: Yutduğunuz takdirede şişemini kendisi, etiket ve mümkünse bu bilgi kağıdı ile bir doktora başvurun, kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı hastaya ağızdan bir şey veymeyin. Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'nin 114 no.lu acil durum hattını arayarak da ambulans çağırın.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Net miktar:

İÇİNDEKİLER:
Dödüne
Tensiofix CG11

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H410: Sıcılı ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P273: Çevreye verilmemesinden kaçınınız.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanınız.

P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/düş ile durulayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kasıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takil ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P337 + P313 Göz tahrişli kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

P301+P310: Yutulduğunda ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktora/teknikçi arayın.

P501: İçerdiği atık yönetimine uygun bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik Riskleri önlemek için, kullanıma talimatlarına uyun.

Süleyman TERLEMEZ
Ziraat Mühendisi



BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Antep Fıstığı Karazek:

1.Uygulama: koruyucu fungisitlerle mücadele yapılacakta koruyucuların mutlaka ilk enteksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde; tedavi edici fungisitlerle mücadele yapılacaksa meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yapraklar tam olarak açıldı döneme uygulanmalıdır. Ayrıca tedavi edici fungisitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döneme kadar uygulama yapılabilir.

2. Uygulama ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün özelliği, etki süreleri ve yağış durumu dikkate alınarak 15 gün aralıklarla yapılır.

Şeftali Yaprak Kıvrıklığı: İlaçlama Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir ilaçlama yapılır.

Elma Karalekesi:

1.Uygulama: çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.Uygulama: pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.Uygulama: çiçek taç yaprakları %70-80'i döktüğüdür.

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak 10 gün aralya uygulanmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Kavisi):

1.Uygulama: çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte)

2. Uygulama: tam çiçeklenmede(%90%100 çiçekte)yapılır.

Ayva Monilya:

Uygulamadan önce bir yıl öncesinden ağaç üzerinde asılı kalan mumya meyveler toplanmalıdır.

1.Uygulama: Çiçeklerin % 51 açılığında

2.Uygulama: Çiçeklerin % 50'si açılığında

3.Uygulama: Tam çiçeklenme devresinde (çiçeklerin %90-100'u açılığında yapılmalıdır.

DIRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ACS PROCOL SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup U:12** olarak sınıflandırılmış bir fungustür. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ACS PROCOL SC**'nin ayrı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup U:12 hariç**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU: Metalaxyl., bakır, dinitroli bileşiklerle ile karıştırılmamalıdır. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce bir ön karışım yapılması tavsiye edilir.

09 Aralık 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

SECTOR

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

ACS PROCOL SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu U:12 FUNGİSİT (Mantar İlacı)
500 g/L Dödiine

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arlara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınıınız.
- Bitki koruma ürünü normal serin ve kuru koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.
- Taxisyeller uygun kullanıldığında ilaç fitotoksik değildir.
- Uygulama esnasında hava sıcaklığı 5°C'nin altında 25 °C'nin üstünde olmamalıdır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarında orijinal ambalajında açılmadan depolandığı 2 yıl süre il ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile İmalatçılar ilaclarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaclarının hatalı depolanması veya Hatalı tatbiki veya taxisyeller uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

GÜNER TARIMSAL MÜH.GIDA HAYV. VE İNŞ.
TAAH. TUR. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
Bor karma O.S.B Ankara Asfaltı 9 km 2 no.lu yol
14 cd. No: 1 Bor – NİĞDE

RUHSAT SAHİBİ:

FİRMA:

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükkaygacık OSB, Mah. 103. Cad. No:9/1 Selçuklu/KONYA
Tel: 90-444 12 83 Fax: +90-332 345 00 93
www.sectortarim.com.tr

Süleyman TERLEMEZ
Ziraat Mühendisi



Deniz BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114