

İmal Tarihi:

Son kullanma tarihi:

Şarj numarası:

Ruhsatname tarihi ve numarası: 19.09.2019/11454

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre
Bağ*	Bağ Mildiyözü (<i>Plasmopara viticola</i>)	200 ml/ 100 L su	14 gün
Domates**	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>) Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	200 ml/ 100 L su 175 ml/ 100 L su	14 gün 14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı, hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

**Domates bitkilerinin gelişmelerinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakirli ilaçların tavsiyesinden kaçınılmalı, ancak organik fungusitlerin bulunmadığı yerlerde bakirli ilaçlarla en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama aletinin deposu yanına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışımı depoya ilave edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ Mildiyözü: 1. uygulama sürgünlük 25-30 cm olunca, 2. ve daha sonraki uygulamalara hastalığın seyrine ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir.

Domates Mildiyözü: Çevrede domates yapıklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz küllü gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanılır, 8-10 gün ara ile devam edilir.

Domates Erken Yaprak Yanıklığı: İlaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanılır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun devam ettiği sürece 8-10 gün ara ile devam edilmelidir.

(Sayfa 2/1)

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. ve TİC. A.Ş.

SECTOR

ZETACUPE

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	M1	Fungisit (Mantar İlaç)
700 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür		

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ


Ağızda madeni bir lezzet, kanlı ishal, yeşil-mavi renkli kusma, hızlı solunma, baş dönmesi, heyecan, bağ ağrısı, halsizlik, mide bulantısı, bulamık görme, fazla miktarda alındığında (5-8 g) mide ve bağırsaklarda ağır metal zehirlenmesi, su ve elektrolit kaybı.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Göz ile temas: Derhal gözleri ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lenslerinizi hemen çıkarın. Derhal tıbbi yardım alın.
Deri ile temas: Derhal ilacı bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yerleri bol su ile yıkayın. Deri tahriş olmuşsa doktora başvurun. İlaç bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.

Yutma: Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını ya da etiketini gösterin. Hastayı kusmaya zorlamayın.

Soluma: Hastayı açık havaya çıkarın. Soluk alıp verme düzenli değilse veya durumun sumi solumun uygulanması gerektiği şüpheliyse, sıcak bir yerde tutun. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın.



Net miktar:

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER

Bakır oksiklorür

ZARARLILIK İŞARETİ



Dikkat

ZARARLILIK İFADELERİ

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA

MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimini arayın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P280: Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz

koruyucu kullanın.

P501: İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre imha edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Balıklara zehirlidir. İlaç artıklarını akarsu, göl ve havuz sularına bulaştırmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

İlaç, orijinal ambalajında ağız kapalı olarak, güneş görmeyen, kuru, havadar bir yerde yiyecek ve yemlerden ayrı bir bölümde kilit altında saklanmalıdır. Normal şartlarda asgari 2 yıl fiziksel ve biyolojik özelliklerini korur.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir. İlaç artıklarını akarsu, göl ve havuz sularına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- **KULLANIMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ.**

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.



DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ZETACUPE adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre grubu M1 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ZETACUPE'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmamız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (M1 grubu hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU

Kalsiyum içeren ürünlerle, karıştırılması tavsiye edilmez. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SECTOR

ZETACUPE

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	M1	Fungisit (Mantar İlacı)

700 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ

Belirtilere göre tedavi uygulayın. Hastayı yalnız bırakmayın. Metahemoglobinemi söz konusu ise %1'lik Metilen Mavisi verin. Gerekli durumlarda sindirim sistemi endoskopisi, hidroelektrik kontrol, kan basıncı kontrolü, karaciğer ve böbrek fonksiyon kontrolleri yapılmalıdır.

Antidotu: EDTA, British Anti-Lewisite (BAL) DIMECAPROL-A veya PENICILAMİNA.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

GÜNER TARIMSAL MÜH.GIDA HAYV. VE İNŞ.
TAAH. TUR. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.

Bor karma O.S.B Ankara Asfaltı 9 km 2 nolu yol
14 cd. No: 1 Bor/NIĞDE

RUHSAT SAHİBİ

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Büyükkayacık OSB, Mah. 103. Cad. No:9/1 Selçuklu/KONYA

Tel: +90-444 12 83 Fax: +90-332 245 00 99

www.sectortarim.com.tr



02 Kasım 2021
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
(Sayfa 2/2)

