

İmal tarihi:
Son kul. Tarihi:
Şarj no:

Ruhsat Tarih ve Numarası: 27.09.2013-9330

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arası süre(gün)
Pamuk	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>) Pamuk yaprakbitti (<i>Aphis gossypii</i>) Pamuk yaprakpörelere (<i>Empoasca decipiens</i> , <i>Asymmetrosca decedens</i>)	40 g/da (Larva-Ergin) 10 g/da (Nimf-Ergin) 10 g/da (Nimf-Ergin)	0 0 0
Patates	Patates böceği (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	6 g/da (Larva-Ergin)	7 gün
Domates (tarla)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	30 g/da (Larva-Ergin)	3 gün
Domates (sera)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	30 g/100 l su (Larva-Ergin)	3 gün
Antep Fıstığı	Antepfıstığı yaprakpörelere (<i>Agonoscena pistaciae</i>)	20 g/100 l su (Ergin,ve Nimf)	7 gün
Elma	Elma yeşil yaprakbitti (<i>Aphis pomi</i>)	20 g/100 l su (Ergin-Nimf)	14 gün
Karpuz	Şeftali yaprakbitti (<i>Myzus persicae</i>)	25 g/da (Ergin-Nimf)	7 gün
Biber (sera)	Şeftali yaprakbitti (<i>Myzus persicae</i>)	25 g/100 l su (Ergin-Nimf)	3 gün

ÖZELLİKLERİ: ACS ACETAM 20 SP sistemik etkilidir.

Uygulamadan kısa bir süre sonra bitki bünyesine geçer ve etkisini 14 ila 21 gün korur.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaç su deposu ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılır.

12 Mart 2021



SECTOR

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

ACS ACETAM 20 SP

Suda Çözünen Toz (SP)

Grup	4A	İNSEKTİSİT (BÖCEK İLACI)
------	----	--------------------------

% 20 Acetamiprid

- Önce Etiket Okuyunuz.
- Evde Kullanmayınız.
- Çocuklardan, Gıda Ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz.
- Bitki Koruma Ürününün Buharını Ve/Veya Zerretlerini Solumayınız.
- Bitki Koruma Ürünü Uygulanmış Sahaya 1 Gün İnsan Ve Hayvan Sokmayınız.
- İnsan Ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önlemek İçin Tavsiye Edildiği Şekilde Ve Tavsiye Edildiği Dozda Kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Hareketlerde yavaşlık, adale kasılmaları, denge bozukluğu, solunum azalışı, gözyaşı, sümük artışı vb.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Genel Tedbirler: Maddenin bulaştığı bütün giysiler derhal çıkarılmalıdır. Zehirlenme belirtileri geç ortaya çıkabileceğinden kazazedeyi en az 48 saat gözetim altında bulundurun.

Göz: Gözlerinizi bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Lens varsa çıkarın. Gerekirse doktora başvurun.

Cilt: KONTAMİNE OLMUŞ BÜTÜN KIYAFETLERİ ÇIKARTIN. Etkilenen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile iyice yıkayın. Eğer tahriş belirtileri varsa ürün etiketini ile doktora başvurun.

Soluma: Hastayı temiz havaya çıkartın. Soluma güçlüğü varsa oksijen verin. Hemen doktora başvurun.

Yutuma: Yutulduğu takdirde şişenin kendisi, etiket ve mümkünse bu bilgi kağıdı ile bir doktora başvurun, kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı hastaya ağzından bir şey vermeyin. Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'nin 114 no.lu acil durum hattını arayın ya da ambulans çağırın.

ANTİDOTU VE TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ(UZEM) Tel: 114

Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Acetamiprid

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



Uyarı Kelimesi: DİKKAT

ZARARLI İFADELERİ

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS

HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P337 + P313Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

P301+P310: Yutulduğunda **ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/hekimi arayın.

P501: İçeriği/kabı tehlikeli atık yönetmeliğine uygun bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri

Önlemek için kullanma talimatına uyun.

Stüleyman TERLEMEZ

Ziraat Mühendisi



KALIBRASYONU:

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alanlara verilecek karışım miktarı iyi sağlanmalıdır. Uygulamaların günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ: İlaçlama aleti sabah çiğ kalktıktan sonra ve akşam serinliğinde yapılmalıdır. İlaçlamadan 6 saat sonra yağmur yağarsa ilaçlama tekrarlanır. Aynı yetiştirme periyodunda 2'den fazla uygulama yapılmamalıdır.

Pamukta tütün beyazineği: Beyazineğe karşı ilaçlı mücadelede ekonomik zarar eşığı, yaprak başına 5 ergin veya 10 larvadır.

Pamuk yaprakbitti: Fide döneminde seyreltme sonrası %50 oranında bulaşma belirlendiğinde ilaçlı mücadele önerilir. Tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbitti saptandığında ilaçlı mücadele önerilir.

Pamukta yaprakpireisi: En az haftada bir yapılacak periyodik kontrollerde, yaprak başına 10 ergin veya nimf yoğunluğuna ulaşmış ve popülasyonu artış eğiliminde ise kimyasal mücadeleye karar verilmelidir.

Patatese patates böceği: Örnekleme için, tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir döneme rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı ilaçlama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar(4.dönem)görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle ilaçlama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması gerekir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebileceğinden, ilaçlama gerekmez.

Domates, Tütün beyazineği: Tütün beyazineği ve sera beyazineği ile bulaşık olduğu saptanan seraya/tarılaya köşegenler yönünden girilir. Her 5 admıda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda mücadeleye başlanır.

12 Mart 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KOSMETİK MÜDÜRLÜĞÜ
KARU EDİLECEĞİ

SECTOR.

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

ACS ACETAM 20 SP

Suda Çözünen Toz (SP)

Grup	4A	İNSEKTİSİT (BÖCEK İLACI)
------	----	--------------------------

% 20 Acetamiprid

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

-Baklılara zehirlidir. Su kaynaklarına, göllere, akarsulara bulaştırmayınız.
-Arlılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
-Bitki koruma ürününü serin, kuru ve havalanabilir yerlerde muhafaza ediniz.

- Tavsiye dozunda fitotoksik değildir.

- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını başka bir amaçla kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde Etkinliğini Garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlara İlgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Büyükkayacık OSB, Mah. 103. Cad. No:9/1 Selçuklu/KONYA

Tel: 90-444 12 83 Fax: +90-332 345 00 93

www.sectortarim.com.tr

ÜRETİM TESİSİ:

RudongHuashengChemicalCo., Ltd.

YangkouChemicalIndustrial Park, YanhaiEconomicDevelopment

Zone, RudongCounty, Jiangsu, China

ÜRETİCİ FİRMA:

CHEMCALL INDUSTRIAL CO.,LTD

10/F NO:818 DongFang Road, Shanghai 200122

P.R. CHINA

Süleyman TERLEMEZ

Ziraat Mühendisi



Antepfıstığı yaprak psilidine karşı: Hafiflik olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce ilaçlama yapılmalıdır.

Elmada yeşil yaprakbitti: Vejetasyon süresi boyunca 100 sürgünden 15'inde bulaşıklık olursa uygulama yapılmalıdır.

Karpuz Şeftali yaprakbitti: Uygulama zamanını saplama amacı ile nisan ayından itibaren tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adında bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinde tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. Karpuz gibi büyük yapraklı bitkilerde bir yaprağa düşen yaprakbitti sayısı 10-20 adet ise uygulamaya başlamak gerekir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ACS ACETAM 20 SP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup 4A** olarak sınıflandırılmış bir insektisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ACS ACETAM 20 SP nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup 4A** hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU: Alkali özellikteki bitki koruma ürünleriyle kullanılmaz. Ancak diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

SECTOR

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

ACS ACETAM 20 SP

Suda Çözünen Toz (SP)

Grup	4A	İNSEKTİSİT (BÖCEK İLACI)
------	----	--------------------------

% 20 Acetamiprid

Süleyman TERLEMEZ
Ziraat Mühendisi



RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:
SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükkayacık OSB, Mah. 103. Cad. No:9/1 Selçuklu/KONYA
Tel: 90-444 12 83 Fax: +90-332 345 00 93
www.sectortarim.com.tr

ÜRETİM TESİSİ:

RudongHuashengChemicalCo., Ltd.
YangkouChemicalIndustrial Park, YanhaiEconomic
DevelopmentZone, RudongCounty, Jiangsu, China

ÜRETİCİ FİRMA:

CHEMCALL INDUSTRIAL CO.,LTD
10/F NO:818 DongFang Road, Shanghai 200122
P.R. CHINA

12 Mart 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

