

Bitki Adı	Kontrol ettiği otlar	Doz/da ve Dönemi
Buğday	Kısır yabani yulaf, Yabani yulaf=(<i>Avena sterilis</i> , <i>Avena fatua</i>) Küçük başaklı kuşyemi (Phalaris minor) Tilki Kuyruğu (Alopecurus myosuroides) Delice (<i>Lolium temulentum</i>)	20 ml /da ; Tercihe buğdayın kardeşlenme Devresinde; en geç kardeşlenme Sonuna kadar kullanılır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumdakten karışım depoya ilave edilir. Karıştırma devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.


ILAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

ACS DOPING 240 EC buğday ve yabanc otlar çıktuktan sonra (post-ern) örneği buğdayın 3 yapraklı evresinden kardeşlenme sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir. **ACS DOPING 240 EC** den en iyi sonuç; yabancı otların çoğunluğunun çıktığı ve örneğin ilik, rutubetli şartlarda aktif olarak büyüdükleri devrede uygulandığında elde edilir. **ACS DOPING 240 EC** kalıcı etkisi olmadığından, ilaç uygulamasından sonra çıkan dar yapraklı yabancı otlar kontrol edilemezler ilaçlamayı müteakip, 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır.

ETKİ ŞEKLİ: **ACS DOPING 240 EC** dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaça hassas dar yapraklı yabancı otlarda aktif büyüme 48 saat içinde durur. Ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak etkileri bir ila üç hafta içinde görülür. Yabancı ot boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümelere gözle görülür, genç yapraklarda sararmayı müteakip ölümler meydana gelir. Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. İlaçın formülasyonunda yer alan yardımcı madde (safener) metabolizmayı teşvik ederek ilacın buğday üzerindeki selektivitesini artırır.



SECTOR

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. ve TİC. A.Ş.

ACS DOPING 240 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Etkili Madde: **240 g/l Cloidinofof-propargyl +60 g/l Cloquintocet mexyl (Safener)**

GRUBU A1 HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK

TUTUNUZ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE /VEYA ZERRELERİNİ

SOLUMAYINIZ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE

HAYVAN SOKMAYINIZ

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN

TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLDİĞİ DOZDA

KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Herhangi bir belirti yoksa, genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Genel Tedbirler: Maddeden bulaştığı bütün giysiler derhal çıkarılmalıdır. Zehirlenme belirtileri geç ortaya çıkabileceğinden

kazazedeyi en az 48 saat gözetim altında bulundurun.

Göz: Gözlerinizi bol su ile en az 15 dak. yıkayın. Lens varsa çıkartın.

Gerekirse doktora başvurun.

Çilt: Kontamine olmuş bütün kıyafetleri çıkartın. Etkilenen vücut

kisimlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile iyice yıkayın. Eğer tahriş

belirtileri varsa ürün etiketi ile doktora başvurun.

Solunum: Hastayı temiz havaya çıkartın. Solunma güçlüğü varsa oksijen

verin. Hemen doktora başvurun.

Yutma: Yutulduğu takdirde şişenin kendisi, etiket ve mümkünse bu

bilgi kağıdı ile bir doktora başvurun, kusturmaya çalışmayın. Bilinci

kapalı hastaya ağızdan bir şey vermeyin. Ulusal Zehir Danışma

Merkezi (UZEM)'nin 114 no.lu acil durum hattını arayın ya da

ambulans çağırın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

İçindekiler: 1) Cloidinafof-propargyl 2) Cloquintocet mexyl (Safener). 3) ksilen

ZARARLILIK İFADELERİ

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu

organlarda hasara yol açabilir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P280: Koruyucu /koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P501: İçeriği/kabı tehlikeli atık yönetmeliğine uygun bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatına uyun.

Süleyman TERLEMEZ
Ziraat Mühendisi



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YABANCI OTLAR 29 Aralık 2020

UYGULAMA ŞEKLİ ve ZAMANI: ACS DOPING 240 EC; orta veya yüksek hacimli yer ilaçlama aletleri ile dekara asgari 20-40 litre su kullanılarak, traktörle çekilen pülverizatörle uygulanmalıdır. İlaçlamada, atomizör veya sırt pülverizatörü kullanılması tavsiye edilmez. İlaçlı mahlulün mütecanis dağılım için düz yelpaze meme (püskürtme açısı; 110 derece) kullanılması tavsiye edilir. Pompa basıncı 2-3 atmosfer olmalı ve bitkiler ilaçlı mahlul ile iyi bir şekilde kaplanmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: ACS DOPING 240 EC Adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına sahip Grup A1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlıya uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için ACS DOPING 240 EC aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A1 harici) bitki koruma ürünlerimin kullanılmasına özen gösteriniz. Kullanılabilir.

KARIŞILIRLIĞI: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.

SECTOR

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. ve TİC. A.Ş.

ACS DOPING 240 EC

Ermülsiyon Konsantr (EC)

Etkili Madde: 240 g/l Clodinafop-propargyl +60 g/l Cloquintocet meetyl (Safener)

GRUBU A1 HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Anılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız,
- Bailıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
- Tıkanmış memeleri ağzınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.
- İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Komşu kültür bitkilerine bulaşmamasına dikkat ediniz.
- İlaçlamada kullanılan alet ve edavatı iyice yıkamadan diğer mücadele işlerinde kullanmayınız.
- Bekleme süresine uyunuz.
- Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) Sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükkayacık OSB Mah. 103. Cad. No:9/1 Selçuklu/KONYA
Tel: 90-444 12 83 Fax: +90-332 345 00 93
www.sectortarim.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA

GÜNER TARIMSAL MÜH. LTD ŞTİ.
Bor karmı O.S.B Ankara Asfaltı 9 km 2 nolu yol 14 cd. No: 1
Bor – NİĞDE

Süleyman TERLEMEZ
Ziraat Mühendisi



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR. 29 Aralık 2020

