

EC FERTİLİZER  
BORON ETANOL AMİN  
NOVABOR

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bor (B)

%W/W

12

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

Bitki Türü	Uygulama Zamanı	Uygulama Sıklığı	100 Litre SU ile birlikte	Toprakta Uygulama (dekara)
Bağ, Kivi	1. uygulama: Göz kabarmasında 2. uygulama: Çiçeklenmeden önce	15-20 gün ara ile	90-100 cc	250-300 cc
Bezelye, Fasulye, Soya ve Baklagiller	Bitkiler 10-15 cm boya erişince kullanılır.	10-15 gün ara ile	75-100 cc	200-250 cc
Buğday, Arpa, Çeltik	Kardeşlenme döneminde		50- 100 cc	150-200 cc
Çilek	1. uygulama: Çiçeklenmeden önce 2. uygulama: İlk uygulamadan 15 gün sonra	10-15 gün ara ile	75-100 cc	250-300 cc
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar	Bitkilerin 4-6 yapraklı döneminde uygulanır.	10 gün ara ile	80-100 cc	250-300 cc
Fasulye, Nohut, Mercimek	Bitkiler 10-15 cm boya erişince kullanılır. Gelişme dönemi boyunca	15-20 gün ara ile	80-100 cc	250-350 cc
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Badem	Çiçeklenmeden önce		100-125 cc	300-400 cc
Havuç	Bitkiler 10-15 cm boya erişince kullanılır.	10-15 gün ara ile	125-150 cc	200-250 cc
Kanola	Gövde genişlemeye başlarken kullanılır.		100-125 cc	250-300 cc
Karpuz, Kavun, Kabak	1. uygulama: Fide dikiminden sonra, 2. uygulama: İlk uygulamadan 15 gün sonra	15 gün ara ile	75-100 cc	150-200 cc
Kiraz, Vişne, Şeftali, Kayısı, Erik	1.uygulama: Çiçeklenmeden önce, 2.uygulama: Hasattan sonra		100- 150 cc	250 - 300 cc
Lahana, Brüksel lahanası, Karnabahar, Brokoli	Bitkilerin 4-6 yapraklı döneminde kullanılır.	10-15 gün ara ile	100-125 cc	200-250 cc
Marul, Kıvırcık salata	Çıkiştan veya şaşırtmadan 10-15 gün sonra uygulanır.	10-15 gün ara ile	50-75 cc	100 cc
Mısır, Ayçiçeği	Bitki boyunun 15-20 cm olduđu dönem ve sonrası	15-20 gün ara ile	75-100 cc	250 - 300 cc
Muz	Çiçeklenmede, doğum dönemi, hasat öncesi	3 hafta ara ile	100-150 cc	250 - 300 cc
Narenciye	Hasattan çiçeklenmeden önce	15-20 gün ara ile	80-100 cc	250-350 cc
Pamuk	Çiçeklenmeden hemen önce uygulanır. Gerek görülürse aynı doz koza oluşumundan sonra tekrarlanır.		80-100 cc	250-350 cc
Patates	1. uygulama %100 çıkıştan 1 hafta sonra, 2.uygulama 10-14 gün sonra, 3.uygulama ise yumru teşekkülü esnasında	10-15 gün ara ile	80-100 cc	100-200 cc
Şeftali, Kiraz, Kayısı, Erik	Çiçeklenme öncesi gözler uyanırken ve pembe göz döneminde ayrıca hasat sonrasında yapraklar dökülmeden kullanılır.		80-100 cc	100-200 cc
Soğan, Sarımsak	Püskürtmeye elverişli yeterli yaprak yüzeyi oluştuğunda kullanılır.		80-100 cc	150-250 cc
Şekerpancarı, Şalgam	Bitkilerin 4-6 yapraklı döneminde kullanılır.	10-15 gün ara ile	80-100 cc	150-200 cc
Tütün	Tarla dönemi başlangıcından itibaren 15 gün arayla 2 kere uygulanır.		80-100 cc	
Yeşil alanlar	Gelişme dönemi boyunca		80-100 cc	
Elma, Armut, Ayva vb	Gözler patladığında ve taç yapraklar dökülünce ve hasat sonrası yapraklar dökülmeden kullanılır. Çiçeklenme döneminde kullanılmaz.		100-125 cc	150-200 cc
Zeytin	Çiçeklenmeden önce ve çiçeklenme sonrası		80-100 cc	250-300 cc

Düşük doz hafif, yüksek doz ağır topraklarda uygulanır. Dekara uygulamada verilen dozlar 1 Ton su hesabı ile verilmiştir.

**KARIŞABİLİRLİK (zirai ilaç, gübreler):** NOVABOR kalsiyum ve bakır hariç her türlü ruhsatlı gübre ve zirai ilaçlarla KARIŞABİLİR, Diğer bitki besleme veya koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce mutlaka ön deneme yapınız.

**UYARILAR:** ASLA UYGUN DOZ MİKTARINI AŞMAYINIZ! SADECE GEREKLİ OLAN YERDE KULLANINIZ! Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Önce etiketi okuyunuz ve evde kullanmayınız. Uygulama esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve buharını ve zerrelerini teneffüs etmeyiniz. Deri ve göz ile temasından kaçınınız teması halinde temas bölgesini bol su ile yıkayınız. Boş ambalajları imha ederek doğayı kirliletmeyiniz. Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilir.



**FİRMA BEYANI:** Firma ürününü, etikette belirtilen şartlara uygun olarak kullandığı takdirde garanti eder. Yanlış kullanımdan dolayı meydana gelecek zararlardan tüketici sorumludur.

**DEPOLAMA:** Doğrudan güneş ışığı almayan, nemsiz ve kuru ortamda +5 ila 30 °C arasında saklanmalıdır. Taşıma ve depolama sırasında kesinlikle ters çevrilmemelidir. Üzerindeki Ok işaretine uygun istiflenmelidir.

Tescil No: Lisans No: Üretim Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi: Parti No: Net Ağırlık:

**ÜRETİCİ FİRMA:** SETO SEBZE TOH. GÜB. ÜRT. İNŞ. TUR. ve SAN. Tic. A. Ş.

ADRES: Antalya Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanı 2.Kısım 24.Cadde No:20 ANTALYA / TÜRKİYE

Tel: 0 242 258 0226 - 258 02 27 - 258 02 28 Fax: 0 242 258 14 16 [info@seto.com.tr](mailto:info@seto.com.tr)/[www.seto.com.tr](http://www.seto.com.tr)

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde 7223 Sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

Sebahat ULUŞAN  
Ziraat Mühendisi  
**SETO**  
SEBZE TOHURLARI GÜBRE ÜRETİM  
İNŞAAT TURİZM ve SAN. TIC. A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanı  
2.Kısım 24.Cad. No:20 07190 ANTALYA  
Tel: 0242 258 02 26-27-28 Fax: 258 14 16  
Ant. Kurumlar V.D: 764 002 4553